

Фармакоэкономическая оценка применения клафорана и его дженериков в условиях хирургического стационара

О.В.Филиппова, Г.И.Зимарин, Е.А.Назаренко., Л.В.Ярилова, Н.П.Буточникова

Воронежская государственная медицинская академия, МУЗ ГО, ГКБ №9 (СМП), Воронеж

Ключевые слова: дженерики, цефотаксим, интратаксим, фармакоэкономическая оценка

По данным аналитик ЦМИ «Фармэксперт» среди АТС 1-го уровня лидерскую позицию по госпитальным продажам в 2005 году, как и в 2004 году, занимают системные антибиотики, составляя более одной четверти объема госпитального рынка (27,5%). Среди МНН, традиционно закупаемых больницами, одно из первых мест рейтинга занимают антибиотики цефалоспоринового ряда. Вместе с тем, закупка ряда антибиотиков оценивается как недостаточная. Так, цефотаксима закупается в 10 раз меньше, чем необходимо для многопрофильного стационара (О.И.Денисова, 2006). Основная тенденция развития госпитального рын-

ка антибиотиков – переход на качественные дженерики.

Цель исследования – сравнительная фармакоэкономическая оценка применения цефотаксима: клафорана (Хехст, Германия) и его дженериков, Интратаксима (LDP, Испания), Цефабола (Аболмед, Россия), цефотаксима (Красфарма, Россия).

Результаты. Эффективность интратаксима, цефабола и клафорана оказалась идентичной. Преполование больного в стационаре составило в среднем 7 дней. Среднерыночная стоимость клафорана 100 руб за флакон 1,0 г. Стоимость курсовой дозы (3

раза в сутки в течение 7-ми дней) = 2100 руб. Пребывание пациента в хирургическом стационаре (7 дней по 670 руб.) = 4690 руб. Всего: 6790 руб. Среднерыночная стоимость Интратаксима (LDP, Испания) составляет 55 рублей за флакон 1,0 г. Стоимость курсовой дозы (3 раза в сутки в течение 7-ми дней) = 1155 руб. Пребывание пациента в хирургическом стационаре (7 дней по 670 руб.) = 4690 руб. Всего: 5845 руб. Среднерыночная стоимость Цефабола (Аболмед, Россия) составляет 93,0 рублей за флакон 1,0 г. Стоимость курсовой дозы (3 раза в сутки в течение 7-ми дней) = 1953 руб. Пребывание пациента в хирургическом стационаре (7 дней по 670 руб.) = 4690 руб. Всего: 6643 руб. Применение дешевого цефотаксима, среднерыночной стоимостью 32 рубля за флакон 1,0 г, по данным оценки клинической эффективности удлиняет продолжительность лечения на 3-4 дня, кроме того, требуется увеличение среднесуточной дозы препарата.

Стоимость курсовой дозы (3 раза в сутки в течение 10-ти дней, без увеличения суточной дозы) = 960 рублей, т.е. заметно (почти в полтора раза) ниже, чем использование брендового препарата. Однако, стоимость пребывания больного в стационаре увеличивается (10 дней по 670 руб.) = 6700 руб. Вместе с антибиотикотерапией стоимость лечения составляет 8620 рублей.

Выводы. Применение самых дешевых антибиотиков-дженериков приводит к удорожанию общей стоимости пребывания больного в стационаре. Для обеспечения экономичной, эффективной и безопасной медикаментозной терапии необходимо использовать высококачественные препараты-дженерики, которые терапевтически эквивалентны оригинальным препаратам. Из исследованных препаратов, содержащих цефотаксим, наиболее оптимальным для использования в условиях хирургического стационара является интратаксим (LDP, Испания).