

Анализ результатов использования аппарата Liga Sure при оперативном лечении хронического геморроя

М.Ф.Черкасов, И.А.Лазарев, А.А.Помазков, Е.П.Сулимов, А.Д.Харагезов, Л.В.Узунян, А.Б.Ефимов, Г.Б.Самойленко

Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону

Ключевые слова: геморрой, геморроидэктомия.

В колопроктологии геморрой занимает одно из первых мест, а его распространенность высока и достигает 140-180 человек на 1000 взрослого населения. Уровень госпитализации этих больных в проктологические и хирургические отделения колеблется от 30 до 40%. Наибольшая распространенность геморроя отмечается в группе лиц зрело-

Ранние послеоперационные результаты исследования представлены в таблице.

Как видно из таблицы при выписке больных из стационара болевой синдром в основной группе сохранялся в 5 раз реже, чем в контрольной, боли в анальном канале при дефекации – 4 раза реже, зуд и жжение сохранились в 5 раз реже, периаанальный

Таблица

Параметры	Контрольная (n=36)	Основная (n=53)
Кровопотеря во время операции	200	20
Продолжительность операции	40±20 мин	10±5 мин
Болевой синдром в течении всего стационарного периода	21 (58,3%)	14 (26,4%)
Боли в анальном канале при последующих актах дефекации	9 (25,0%)	3 (5,7%)
Зуд и жжение в анальном канале во время и после акта дефекации	5 (13,9%)	2 (3,7%)
Кровянистые выделения во время акта дефекации	19 (52,8%)	9 (16,9%)
Гипертермия в ближайшем п/о периоде	22 (61,1%)	16 (30,1%)
Периаанальный отек после операции	15 (41,7%)	8 (15,1%)
Сроки пребывания в стационаре	10-12 дн.	5-7 дн.
Амбулаторное долечивание	18-20 дн.	10-12 дн.

го и пожилого возраста, достигая 210-240 на 1000 населения.

Одним из новых радикальных способов лечения является геморроидэктомия с применением аппарата Liga Sure. В связи с этим, нами было проведено исследование, целью которого явилось изучение и сравнение результатов оперативного лечения больных хроническим геморроем III-IV стадии, оперированных в колопроктологическом отделении клиники РостГМУ по стандартной методике – больным выполнена операция Миллигана-Моргана во II-й модификации ГНЦК и с использованием аппарата Liga Sure.

За 2 последних года в колопроктологическом отделении хирургического центра РостГМУ были выполнены операции геморроидэктомии 89 больным хроническим геморроем 3-4 стадии, которые составили две рандомизированные группы больных.

В основную группу вошли 53 пациента, которым выполнялась геморроидэктомия с использованием аппарата Liga Sure, контрольную группу составили 36 человек, которым выполнялась операция Миллигана-Моргана во II-й модификации ГНЦК.

отек и кровянистые выделения во время дефекации – в 3 раза реже, чем в контрольной группе. Отдаленные результаты нами были прослежены в течение 6-12 месяцев.

Длительность пребывания больных в стационаре в основной группе после операции составляла 5-7 дней, в контрольной 10-12 дней, а сроки амбулаторного долечивания составляли 10-15 и 18-20 дней соответственно.

Отдаленные результаты лечения удалось отследить у 25 больных, у которых послеоперационный период составлял 2-3 мес.: 12 человек из основной группы и 8 человека из контрольной. В основной группе пациенты жалоб не предъявляли, в контрольной группе 2 пациента предъявляли жалобы на боли в заднем проходе во время дефекации и чувство дискомфорта в анальной области при физической нагрузке.

Использование аппарата Liga Sure: сокращает кровопотерю, время операции, время заживления послеоперационных ран; позволяет отказаться от применения лигатур; снижает вероятность появления ранних и поздних послеоперационных осложнений; уменьшает время пребывания больного в стационаре.